

Les contre-indications à la TH chez le receveur sont:

1. Un âge de 65 ans
2. Une thrombose localisée au tronc porte
3. Une néoplasie extra-hépatique évolutive
4. Une HTAP avec PAPm \leq 35 mmHg
5. Un alcoolisme chronique non sevré

Les contre-indications à la TH chez le receveur sont:

1. Un âge de 63 ans
2. Une thrombose localisée au tronc porte
3. Une néoplasie extra-hépatique évolutive
4. Une HTAP avec PAPm \leq 35 mmHg
5. Un alcoolisme chronique non sevré

Le bilan pré- TH chez le receveur comporte obligatoirement:

1. Un typage HLA
2. Une évaluation de la stéatose hépatique
3. Une coloscopie chez les sujets de plus de 40 ans
4. Une ostéodensitométrie osseuse
5. Un examen ORL avec nasofibroscopie chez les sujets tabagiques

Le bilan pré- TH chez le receveur inclut obligatoirement:

1. Un typage HLA
2. Une évaluation de la stéatose hépatique
3. Une coloscopie chez les sujets de plus de 40 ans
4. Une ostéodensitométrie osseuse
5. Un examen ORL avec nasofibroscopie chez les sujets tabagiques

Dans la cirrhose avec un score de MELD bas, une transplantation hépatique est indiquée en priorité en cas de:

1. Syndrome hépato-rénal type 1
2. Ascite réfractaire
3. Encéphalopathie hépatique récurrente
4. Infection spontanée du liquide d'ascite
5. Syndrome hépato-pulmonaire

Dans la cirrhose avec un score de MELD bas, une transplantation hépatique est indiquée en priorité en cas de:

1. Syndrome hépato-rénal type 1
2. Ascite réfractaire
3. Encéphalopathie hépatique récurrente
4. Infection spontanée du liquide d'ascite
5. Syndrome hépato-pulmonaire